

# 卵巢癌病症不明显 我该注意什么？

▼腹痛和腹部肿胀是卵巢癌的常见症状。  
(示意图)



廖慧婷 报道

liaoh@spf.com.sg

新加坡国立癌症中心数据指出，被称为“沉默的女性杀手”的卵巢癌是我国癌症第五号杀手。2010年至2014年期间，每年有343宗病例。引发卵巢癌风险的因素包括迟生育、月经早来、更年期延后、未孕乳癌、基因因素和子宫内膜异位症(endometriosis)。

每年全球有约14万妇女因卵巢癌而离世。它也是妇产科癌症中生存率最低的病症。这和它缺乏明显病症，以及病发时已是癌症后期有关。国际组织在每年的5月8日国际卵巢癌日呼吁全球正视



卵巢癌，提高全球妇女预防意识。

伊丽莎白医院妇产专科黎成意医生，与读者分享一些卵巢癌知识。



伊丽莎白医院  
妇产专科黎成意医生（受访者提供）



## 为什么卵巢癌是“沉默的女性杀手”？

黎医生：卵巢癌发病初期无明显症状，不易被发觉。许多初期患者有些会出现腹痛、腹部肿胀等病症状，误以为胃病甚至是怀孕，直到卵巢癌发展到后期后才被确诊。

根据新加坡癌症登记处的统计，卵巢癌初期患者（第一、二期）的存活率介于57%到78%之间；相比于后期患者（第三、四期）低于30%的存活率，高上许多。这也是为何卵巢癌被称为“沉默的女性杀手”的原因。

据新加坡防癌协会的资料，卵巢癌的高风险群包括：有卵巢癌家族病史的人、爱吃高脂饮食的人和早经及较晚停经的人。



## 卵巢癌有什么症状？

黎医生：卵巢癌的常见症状包括  
- 腹部肿胀不适  
- 腹痛和腹部变大  
- 经期异常，或停经后阴道流血  
- 食欲不振  
- 便秘或如厕习惯改变  
- 腹部胀气、消化不良  
- 经常感到疲累。  
出现症状，要找医生做进一步体检。



如孕妇，最终成功开刀切除  
第三期卵巢癌患者郑盈莉，  
肚子大公



## 要如何检测和治疗卵巢癌？

黎医生：目前检测的方式包括：超声波扫描和血液检测一种名为CA125的血液蛋白水平，它与卵巢癌的发生具有一定关联。

患者主要能经过手术和化疗来治疗卵巢癌。

病人在确认癌症性质和病期后，或

可选择开刀切除卵巢、输卵管和可见肿瘤的部分。有意保留生殖能力的患者，或能只治切除受影响的卵巢和输卵管部位。

有些初期患者只需要开刀治疗即可；然而许多患者到了后期才确诊，除了手术外，也需要化疗配合。早期患者也可能在切除手术后，进行化疗预防癌症复发。